

3. Колот В.Н., Воробьева В.И. Эффективность разных способов скрещивания сои // Селекция и семеноводство. – 1984. – №10. – С.8.
4. 4. Клубук В.В., Михайлов В.О. та ін. Селекція сої в умовах зрошення Півдня України // Зрошуване землеробство. – 2009. – Вип. № 51. – С.139 – 144.
5. Доспехов Б. А. Методика опытного дела (с основами статистической обработки результатов исследований) 5-е изд., доп. И перераб. – М.: Агропромиздат. 1985. – 351с.
6. Кобизєва Л.Н., Рябчун В.К. та ін. Широкий уніфікований класифікатор роду Glycine max (L.) Merr. – Харків. – 2004. – 37 с.
7. Орлюк А.П. Теоретичні основи селекції рослин . – Херсон: Айлант, 2008. – 572 с.
8. Колот В.Н. Гибридизация сои в условиях орошения юга Украины //Бюл. НГИ по масличным культурам. – 1980. – Вып. 1. – С. 53 – 54.
9. Зеленцов С.В. Современные аспекты селекционно-генетического улучшения сои. Автореф. дис...доктора с.-х. наук: 06,01,05 / Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В.С. Пустовойта РСА. – Краснодар, 2005. – 42 с.

УДК: 633.196:632:631.6 (477.72)

**ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН НА
ПОЛІВНИХ ЗЕМЛЯХ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ**

ШЕВЧУК С. Л. – м. н. с.
Інститут землеробства південного регіону НААН України

Вступ. Основними шкодочинними об'єктами, що негативно впливають на врожайність сої, є бур'яни, шкідники та хвороби [1, 5, 6, 7]. Останні маловивчені, а звідси і заходи проти них мають стихійний та малоекективний характер. В роки з несприятливими погодними умовами під час дозрівання урожаю схожість зібраного насіння, особливо середньостиглих та пізньостиглих сортів, внаслідок враження хворобами коливається в межах 60-70%, що не може бути фундаментом високої врожайності - 3,5 – 4,5 т/га. Причини такого явища маловідомі, а проведений аналіз літературних даних свідчить, що на Півдні України такі роботи практично не велися. Особливого значення це питання набуло в останні роки, коли на зрошуваних

землях Півдня України почали впроваджуватися короткоротаційні сівозміни з набором 3–4 високорентабельних культур, серед яких обов'язково присутня соя. В таких випадках відбувається скорочення терміну повернення сої у часі, що веде до накопичення збудників різних захворювань.

Таким чином, впровадження нових високоврожайних сортів вимагає розробки елементів захисту рослин сої саме від хвороб, адже із збільшенням біологічного потенціалу імунна система рослин, як правило, слабшає, особливо під час репродуктивного процесу. Схема досліду наведена у таблиці 1.

Завдання і методика досліджень. Мета досліду – встановити врожайність та посівні якості насіння сортів сої різних груп стигlosti при застосуванні засобів захисту рослин від хвороб на поливних землях.

Дослід польовий, трьохфакторний, повторення чотириразове, проводили на дослідному полі ІЗПР. Ґрунт дослідного поля темно-каштановий, залишково-солонцоватий, середньо-суглинковий. В орному шарі вміст NO_3 на 100 г ґрунту становив 3,2 мг, P_2O_5 – 4,5 мг, K_2O – 28 мг. Рельєф ділянки рівний.

Досліди проводили відповідно до загальновідомих методичних видань [2, 3, 4]. Технологія вирощування культури загальноприйнята для зрошуваних умов Півдня України [7]. Для захисту посівів від бур'янів під передпосівну культивацію вносили гербіцид Фронтьєр Оптима – 1,2 л/га. Сіяли сівалкою СО-4,2. Протягом вегетації було проведено 4-5 поливів поливною нормою – 600 м³/га кожний. Вологість ґрунту визначали термостатноваговим методом. Проведено 5 міжрядних культивацій. Урожай збирали комбайном Сампо-130. Після зважування зерна визначали його засміченість, вологість. Після очищення і досушування зерна визначали посівні якості насіння за ДСТУ 4138 (2002 рік).

Таблиця 1. – Ефективність застосування протруйників і фунгіциду Фортеця проти хвороб на сортах сої різних груп стигlosti, 2009 р.

Фактор А (сорти)	Фактор Б (протруйники)	Фактор С (строки внесення фунгіцидів)	Ураженість перонос-порозом, балл	Урожайність ц/га,	Середня урожайність ц/га		
					Фактор А	Фактор Б	Фактор С
Діона	1.Контроль	1. Без обробки	1,5	18,9	20,2	24,5	24,6
		2. АА	1,2	19,7		24,6	
		3. ВВ	0,5	20,5		25,0	
		4. СС	0,2	21,1		25,2	
		2.Максим	1. Без	0,6		24,9	

Фактор А (сорти)	Фактор Б (протруйники)	Фактор С (строки внесення фунгіцидів)	Ураженість пероноспорозом, балл	Урожайність ц/га,	Середня урожайність ц/га		
					Фактор А	Фактор Б	Фактор С
Аполон	XL-1л/т протруєння насіння перед сівбою	обробки					
		2. AA	0,6	20,3			
		3. BB	1,4	20,1			
		4. CC	0,4	19,5			
	3. Фундазол 50% - 2л/т протруєння насіння перед сівбою	1. Без обробки	0,6	19,6	25,1		
		2. AA	0,2	19,9			
		3. BB	0,5	20,3			
		4. CC	-	20,3			
	1.Контроль	1. Без обробки	0,8	25,7			
		2. AA	0,2	26,1			
		3. BB	1,1	26,6			
		4. CC	-	25,8			
	2.Максим XL-1л/т протруєння насіння перед сівбою	1. Без обробки	0,2	27,6			
		2. AA	0,5	26,6			
		3. BB	-	26,3			
		4. CC	0,4	28,6			
	3. Фундазол 50% - 2л/т протруєння насіння перед сівбою	1. Без обробки	0,8	26,3			
		2. AA	0,2	26,9			
		3. BB	-	27,4			
		4. CC	0,4	27,5			
Деймос	1.Контроль	1. Без обробки	1,4	27,1			
		2. AA	0,2	27,5			
		3. BB	0,4	27,4			
		4. CC	-	28,0			
	2.Максим XL-1л/т протруєння	1. Без обробки	0,2	26,4			
		2. AA	0,2	26,5			
		3. BB	0,2	27,8			

Фактор А (сорти)	Фактор Б (протруйники)	Фактор С (строки внесення фунгіцидів)	Ураженість перонос-порозом, балл	Урожайність ц/га,	Середня урожайність ц/га		
					Фактор А	Фактор Б	Фактор С
насіння перед сівбою	4. СС	0,2	27,0				
3. Фундазол 50% - 2л/т	1. Без обробки	0,2	27,8				
протруєння насіння перед сівбою	2. АА	-	27,8				
	3. ВВ	0,2	28,7				
	4. СС	0,2	28,9				

Примітка: АА - Фортеця 250 ЕС 25% к.е.к.– 0,5л/га у фазу 3 пари листків; ВВ – Фортеця 250 ЕС 25% к.е.к.– 0,5л/га у фазу бутонізації; СС - Фортеця 250 ЕС 25% к.е.к.– 0,5л/га у фазу кінець цвітіння.

У досліді висівалися три сорти сої (перший фактор): Діона (ранньостиглій); Аполон (середньостиглій); Деймос (пізньостиглій). Сорти сої висівали необробленим та протруєним насінням препаратами Максим XL і Фундазолом (другий фактор). У період вегетації посіви обробляли фунгіцидом Фортеця у фази трьох пар справжніх листків, бутонізацію і в кінці цвітіння (третій фактор). Норма висіву насіння сорту Діона – 650 тис.шт./га, Аполон – 550 тис.шт./га, Деймос – 450 тис.шт./га.

У досліді основними хворобами були пероноспороз, або несправжня борошниста роса, бактеріальний опік, зморшкувата мозаїка.

При застосуванні фунгіциду обліки проводили до та після обробки через 7 та 15 діб після обприскування.

Таблиця 2. Шкала оцінки ураження рослин збудниками хвороб

Бал	Ступінь ураження	Ураження поверхні, %
0	Здорові рослини	0
1	Слабке	1-10
2	Середнє	11-25
3	Сильне	26-50
4	Дуже сильне	Понад 50

Інтенсивність поширення хвороб і ступінь ураження (розвитку) встановлювали при огляді не менше як 100 рослин, рівномірно розташованих на ділянці, при цьому візуально встановлювали кількість хворих за відповідним балом.

Розвиток хвороби визначали за формулою:

$$Px = \frac{100 \sum(a \cdot b)}{H \cdot B}, \quad [4]$$

де Px – розвиток хвороби;

де $\sum(a \cdot b)$ – сума добутків кількості рослин (a) на відповідний бал ураження (b);

H – загальна кількість рослин у пробі, шт.;

B – найвищий бал ураження (за прийнятою шкалою - 4).

Основним показником ефективності застосування препаратів є зниження враження рослин порівняно з контролем.

Облік захворювань, проведений у липні, показав, що на сорти Діона, рослини якого на цей час були на початку бутонізації, спостерігалась поява переноспорозу. На контролі цього сорту ступінь захворювання складав 1,5 бала, на сорти Аполон у цій фазі – 1 бал, на сорти Деймос ознаків цієї хвороби не було виявлено.

Застосування фунгіциду Фортеці (0,5 л/га) у фазу бутонізації сприяло зменшенню розвитку цієї хвороби до нульового значення на усіх сортах.

У фазу бутонізації ступінь ураження зморшкуватою мозаїкою був найбільшим на сорти Аполон – 1,5 бали, Діоні – 1 бал, на сорти Деймос захворювання не було виявлено.

Серпень був несприятливим для вегетації сої. Опадів за місяць випало всього 1 мм при нормі 37 мм. Посуха продовжувалась і у вересні. Така погода дещо стримувала розвиток переноспорозу. У фазі кінця цвітіння ураженість необроблюваних посівів переноспорозом становила на сорти Діона – 1,5 бала, на сорти Аполон – 0,8 бала і на сорти Деймос – 1,4 бала.

Ефективність застосування фунгіциду Фортеця з нормою витрат 0,5 л/га проти переноспорозу, при внесенні його у фазу кінця цвітіння на сорти Діона становила 66,7%, на сорти Аполон – 75% і на сорти Деймос – 85%, по відношенню до контролю без пестицидів. Зважуючи на це, можна вказати, що ефективність застосування фунгіциду Фортеця була вищою на пізностиглих сортах.

Щодо продуктивності посівів сортів, що вивчаються, то найвища урожайність сої – 28,9 ц/га одержана на сорти пізностиглому Деймос із застосуванням протруйника Фундазол (2 л/т насіння), та фунгіцид Фортеця (0,5 л/га) у кінці цвітіння (урожайність на контролі – 27,1 ц/га). НІР₀₅ – 1,1 ц/га.

Ефективність застосування пестицидів проти переноспорозу при цьому становила 92,9%, порівняно з контролем, де ураженість цим захворюванням становила 1,4 бали.

Висновки. В умовах вегетаційного сезону 2009 року найвища врожайність насіння сої одержана на сорти Деймос – 28,9 ц/га при

застосуванні протруйника Фундазол (2 л/т насіння) та фунгіциду Фортеця (0,5 л/га) у кінці цвітіння. Урожайність на контролі - 27,1 ц/га. НІР₀₅ - 1,1 ц/га.

Ефективність застосування пестицидів проти пероноспорозу становила 92,9%, порівняно з контролем, де ураженість цим захворюванням становила 1,4 бали.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Адамець Ф.Ф., Вергунов В.А., Лазер П.Н., Вергунова И.Н. Агробиологические особенности возделывания сои в Украине. – К.: Аграрная наука. – 456 с.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) - М.:Колос, 1985г. – 351 с.
3. Методические рекомендации по проведению полевых опытов в условиях орошения УССР (Особенности проведения, уборка и учет урожая), 1985г. – 114 с.
4. Трибель С.О., Сігарьова Д.Д., Секун М.Н. та ін. Методики випробування і застосування пестицидів. – К.: Світ, 2001. – 448 с.
5. Соя. Технологічні аспекти вирощування насіння. В.Ф.Петріченко, А.О. Бабич, С.І.Колісник, С.В.Іванюк та ін. - Насінництво. – 2008 - № 6 – с.5-9.
6. Турін Є.М. Біопрепарати – проти фітофагів. Ефективність обробки насіння сої сорту Витязь-50 біологічними засобами в умовах Криму. Карантин: захист рослин. – 2007. - №11. - с.10-11.
7. Соя. Перспективи та проблеми виробництва. Нікішенко В.Л., Клубук В.В., Заєць С.О. та ін. - Науково-методичні рекомендації. – Херсон: ВАТ «Херсонська міська друкарня», 2009. – 36 с.